

Diabetinė pėdos opa

INFORMACIJA APIE PACIENTĄ

68 metų amžiaus vyras

OPOS ANAMNEZĖ

Trauma nuo durų dorsaliniame pėdos paviršiuje.

MATMENYS

Prieš SNAP™ terapiją opos matmenys buvo 70 mm x 54 mm, gylis – 4 mm, be po oda esančio pažeidimo.

GRETUTINĖS LIGOS

Cukrinis diabetas, rūkymas, periferinių kraujagyslių liga, koronarinė širdies liga, LOPL, arterinė hipertenzija, hiperlipidemija.

GYDYMAS SNAP™ TERAPIJA

Pacientas buvo gydomas SNAP™ terapija 3 savaites, kol buvo pasiekta visiška opos pagrindo granuliacija. Dar 5 savaites SNAP™ terapija buvo taikoma kartu su ląstelinio audinio gaminiu.

REZULTATAS

Žaizdos uždarymas pasiektas per 9 savaitių nuo gydymo SNAP™ terapija pradžios.



SNAP™ terapijos pradžia



2 savaitė



8 savaitė

SMART GYDYTOJAMS

SMART PACIENTAMS

SMART ĮSTAIGOMS

Kaip ir su kiekvienu klinikiu atveju, pasiekti rezultatai neturėtų būti vertinami kaip panašių rezultatų garantija. Individualūs rezultatai gali skirtis pagal pacientų ypatybes ir būkles.

PASTABA. KCI gaminiams ir terapijoms taikomos specifinės indikacijos, kontraindikacijos, įspėjimai, atsargumo priemonės ir saugos informacija. Prieš naudodami pasitarkite su gydytoju ir peržiūrėkite gaminio naudojimo instrukcijas. Ši medžiaga skirta sveikatos priežiūros specialistams.

© KCI Licensing, Inc., 2016 m. Visos teisės saugomos. Šiame dokumente nurodyti prekių ženklai priklauso KCI Licensing, Inc., jos filialams ir (arba) licencijos išdavėjams. DSL#16-0511.DAW6.OUS (2016-08)

Igaliojasis platintojas:



An Acelity Company



UAB „Sormedica“, el. paštas info@sormedica.lt



Acelity™